



Съемные зубные протезы. Особенности адаптации

Сделанные своевременно зубные протезы – это одновременно лечебное и профилактическое средство, они восстанавливают нарушенные функции жевания и речи и предупреждают деформацию зубных рядов. Съемные зубные протезы – это полные и частичные пластиночные протезы, бюгельные, ацеталовые и протезы акри-фри.

– Как привыкнуть к съемным зубным протезам?

В самом начале использования съемные протезы могут ощущаться как инородное тело, они могут нарушать дикцию, вызывать повышенное слюноотделение, изменение вкусовых и температурных ощущений, а также затрудненное откусывание и разжевывание пищи. Возможна неудовлетворительная фиксация протезов или попадание остатков пищи под них. Все эти явления уменьшаются к концу первой недели ношения протезов и проходят примерно через 3-4 недели. После периода адаптации пациент уже комфортнее чувствует себя с протезами, чем без них. Большое значение имеет реакция органов и тканей полости рта и всего организма в целом на зубной протез, это зависит во многом от типа высшей нервной системы человека, возраста

и общего состояния здоровья. В среднем, процесс адаптации к частичным съемным протезам длится около двух месяцев. Пациенты с полным отсутствием собственных зубов осваиваются с пластиночными протезами примерно от двух до шести месяцев. Главным условием скорейшего привыкания к протезам является желание пациента преодолеть трудности, научиться постоянно ими пользоваться и выполнять указания врача.

– Что такое коррекция (поправка) протеза?

После наложения съемных зубных протезов в полости рта, как правило, появляются болевые ощущения в некоторых участках под ними. Это обусловлено неизбежным постепенным оседанием (давлением) съемного зубного протеза на слизистую оболочку. Поэтому для устранения неприятных ощущений необходимо записываться

к Вашему стоматологу на проведение коррекции протеза, которая заключается в «подтачивании» протезов в тех участках, где он наминает слизистую оболочку полости рта. На коррекцию необходимо приходиться по мере необходимости. Не пытайтесь самостоятельно корректировать протезы – это может привести к поломке протеза и нарушению его фиксации и в результате придется изготовить новые протезы. При сильных болях нужно снять зубные протезы и положить их в специальный контейнер, а перед тем, как идти к врачу на коррекцию, протезы обязательно нужно надеть и походить с ними не менее 3-4 часов. Это позволит врачу увидеть четкий отпечаток на слизистой оболочке и скорректировать только то место, которое натирает десну.

ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ»

150054, г. Ярославль,

ул. Богдановича, д. 22

Предварительная запись

по телефону: (4852) 32-15-25

www.pk-стоматолог.рф



ООО «ПК «Стоматолог»

Год основания 1988

Протезирование зубов

Предварительная запись:

Понедельник - Пятница: 10.00 – 19.00

Суббота: 11.00 – 16.00

**150054, г. Ярославль
ул. Богдановича, д. 22
1 этаж**

**тел.: (4852) 32-15-25
www.pk-стоматолог.рф**

Лицензия № Л041-01132-76/00290782 выдана 27.12.2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, срок действия лицензии – бессрочно. Реклама. 7950

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.